

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR VACUNA DE SARAMPION-RUBEOLA DURANTE LA CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO 2010 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NOMBRE DEL JARDIN/ COLEGIO: _____

Por favor leer la totalidad de este escrito antes de llenar los datos solicitados

Todos los datos personales de los adultos y niños relacionados en este documento serán manejados con total confidencialidad.

DEBE DILIGENCIARSE UN FORMATO DE AUTORIZACIÓN POR CADA NIÑO(A)

Manifiesto que he leído la información suministrada (que figura en este documento) sobre los beneficios y los riesgos que podría suponer la administración de la vacuna bivalente contra el Sarampión y la Rubeola solicitada, que estoy satisfecho/a con la información recibida y la he comprendido.

Yo _____ con cédula número _____
como adulto responsable del niño/a _____
conociendo los beneficios que aporta la vacunación y los riesgos a que lo expongo tanto si es vacunado como si no recibe la vacuna oportunamente: *(marcar con "X" la opción elegida)*

- OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el niño/a sea vacunado _____
- **NO** OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el niño/a sea vacunado _____

El día de la Vacunación por favor enviar el carné de vacunas con el niño

Firma Padre/ Responsable del menor: _____

Nombre Padre/Responsable del menor: _____ **C.C.** _____

No. Documento identificación del menor: _____ **Fecha nacimiento:** _____

Edad: _____ años

Afiliación en salud del menor (EPS): _____

Dirección Residencia: _____ **Teléfono:** _____

Vacuna Aplicada: _____ **Lote:** _____ **Fecha Aplicación:** _____

HOJA INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA BIVALENTE CONTRA SARAMPIÓN-RUBEOLA (SR)

¿QUIENES DEBEN VACUNARSE?

En el esquema regular de vacunación los niños reciben al cumplir 1 y 5 años una vacuna conocida como “triple viral” que protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis (paperas). En esta campaña se busca vacunar **a todos los niños y niñas entre 1 y 8 años**, sin importar si ya tuvieron vacuna previa de triple viral a cualquier edad.

¿POR QUÉ ES NECESARIO VACUNARSE?

El Sarampión y la Rubeola son enfermedades graves pero afortunadamente muy infrecuentes en la actualidad en nuestro país. Por esta razón, buscando la eliminación definitiva de estas enfermedades el Ministerio de la Protección Social ha establecido esta gran Campaña de Vacunación contra el Sarampión y la Rubeola. Muchos niños no han recibido las vacunas del esquema regular (especialmente se olvida la de los 5 años) y una proporción de niños que la recibieron no crearon las defensas necesarias por esto es necesario dar esta “segunda oportunidad” para conseguir la protección contra estas enfermedades

¿QUÉ VACUNA SE APLICARÁ?

Vacuna bivalente sarampión-rubéola del Instituto Serum de la India. Es una inyección que se aplica en forma subcutánea en el brazo.

¿ALGUNAS PERSONAS NO DEBEN VACUNARSE O DEBEN ESPERAR?

- Los niños que tuvieron una reacción alérgica seria a otras vacunas o al antibiótico neomicina no deben vacunarse con SR.
- Las mujeres embarazadas
- Niños con cáncer, o con enfermedades que comprometen su sistema inmunológico, o trastornos de la coagulación deben consultar con su médico tratante antes de vacunarse.
- Se recomienda que los niños con enfermedades agudas como gripas moderadas o severas no se vacunen hasta que se recuperen.
- La fiebre baja, infecciones respiratorias o diarrea leves y otras enfermedades menores no deben considerarse como contraindicaciones.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA SR?

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar problemas serios como reacciones alérgicas graves. Pero el riesgo de que la vacuna SR cause daños graves es extremadamente pequeño. Vacunarse contra SR es mucho menos peligroso que contraer alguna de estas dos enfermedades.

La mayoría de las personas que reciben esta vacuna (millones en el mundo) no tienen ningún problema relacionado con ella. Los problemas que se pueden presentar y su frecuencia son:

- Fiebre: 1 de cada 6 vacunados
- Sarpullido (brote): 1 de cada 20 vacunados
- Dolor y/o rigidez en las articulaciones: 1 de cada 4 vacunados adolescentes o adultos, es raro en niños.
- Disminución transitoria de las plaquetas: 1 de cada 30.000 dosis aplicadas
- Reacción alérgica grave: menos de 1 en cada millón de dosis aplicadas
- El dolor y la sensibilidad en el sitio de la inyección son frecuentes.

¿HABRÁ OTROS PUNTOS DE VACUNACIÓN DIFERENTES AL COLEGIO?

Dado que se trata de una Campaña Nacional muy ambiciosa habrá puntos de vacunación durante mayo y junio en Bogotá y durante junio y julio en las demás ciudades del país. Los Clinisanitas tendrán la vacuna disponible. Sin embargo la vacunación en el colegio evitará desplazamientos a la familia y disminuirá el riesgo de postergar indefinidamente esta cita con la salud de su hijo.

¿DONDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

- Pregunte a su médico de confianza.
- En las páginas web del Ministerio de la protección social (www.minproteccionsocial.gov.co) y de la Secretaría Distrital de salud de Bogotá (www.saludcapital.gov.co)
- En Fonosanitas 375 9000